



ISTRUZIONI

CHIRURGIA PARODONTALE

Gentile Paziente,

dopo un intervento di chirurgia parodontale, sono possibili alcuni inconvenienti (dolore, sanguinamento, gonfiore, febbre), al fine di ottenere una buona guarigione, segua scrupolosamente i seguenti consigli:

1. assumere l'ANTIBIOTICO:

AUGMENTIN gr 1 cpr

2 compresse un'ora prima dell'intervento preferibilmente a stomaco vuoto

1 compressa 6 ore dopo la prima assunzione (o a discrezione del chirurgo alla sera)

i 4/5 giorni successivi 1 compressa ogni 12 ore

in caso di allergia all'amoxicillina

KLACID cpr 250

2 compresse un'ora prima dell'intervento

1 compressa sei ore dopo.

2. assumere TORADOL cpr

1 compressa un'ora prima dell'intervento a stomaco pieno

3. in caso di dolore, massimo 3 compresse al giorno (a discrezione del paziente) a stomaco pieno

4. dopo l'intervento, NON bisogna effettuare sciacqui; espellere il sangue sputando

5. tenere la borsa del ghiaccio per 2/3 ore (alternando 15 minuti con e 10 minuti senza) per ridurre il gonfiore

6. la prima sera mangiare cibi freddi e morbidi, spazzolare i denti non coinvolti

7. per la prima notte, dormire con la testa sorretta da due cuscini

8. dal giorno successivo l'intervento, riprendere le manovre di igiene orale abituali **SENZA UTILIZZARE IL DENTIFRIZIO, AGGIUNGENDO:**

a. DUE SCIACQUI AL GIORNO, MATTINA E SERA, PER UN MINUTO, CON UN COLLUTORIO A BASE DI CLOREXIDINA (es Curasept ADS 0,2% o Dentosan 0,20) **NON DILUITO**, dopo la normale igiene orale delle altre aree, per DUE settimane

b. SPAZZOLINO CHIRURGICO (es. Meridol Perio Gaba Vebas o Curaprox Ultrasoft CS 5460) dopo i giorni stabiliti per il collutorio

9. per 2 settimane, non fumare e non assumere alcolici

10. dopo una settimana, ritornare in Studio per rimuovere le suture

11. Utilizzare AMINOGAM gel secondo le indicazioni del chirurgo

12. in caso di sanguinamento eccessivo, dubbi o problemi, ci contatti immediatamente: 0381312317, 038182291 (notturno)